

Calendário de *vacinação* DO NASCIMENTO À TERCEIRA IDADE



RECOMENDAÇÕES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES (SBIIm) - 2020/2021

VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																			ADOLESCENTE 11 A 19 ANOS	ADULTO 20 A 59 ANOS	IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS		
	AO NASCER	1 MÊS	2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES	7 MESES	8 MESES	9 MESES	12 MESES	15 MESES	18 MESES	24 MESES	4 ANOS	5 ANOS	6 ANOS	9 ANOS	10 ANOS				GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIEs
BCG ID	1 DOSE	VACINAR OS NÃO VACINADOS ANTERIORMENTE													VACINAR PESSOAS CONTACTANTES DE HANSENÍASE			SIM	SIM	NÃO					
Hepatite B	3 OU 4 DOSES A PARTIR DO NASCIMENTO						VACINAR OS NÃO VACINADOS ANTERIORMENTE													SIM	SIM	SIM			
Rotavírus	2 OU 3 DOSES DEPENDENDO DA VACINA UTILIZADA (VR1 OU VRS). INICIAR VACINAÇÃO ANTES DAS 15 SEMANAS DE VIDA.						CONTRAINDICADA													SIM	SIM	NÃO			
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	3 DOSES (DTPa ou DTPw) INICIANDO AOS 2 MESES DE IDADE									REFORÇO		REFORÇO COM DTPa, DTPw OU dTpa		REFORÇO COM dTpa A PARTIR DOS 9 ANOS DE IDADE E A CADA DEZ ANOS (OU, NA IMPOSSIBILIDADE DE dTpa, FAZER dT)			SIM, DTPw E dT dTpa PARA GESTANTES	SIM, DTPa E dTpa	SIM, DTPa						
Haemophilus influenzae b	3 DOSES INICIANDO AOS 2 MESES DE IDADE									REFORÇO	VACINAR OS NÃO VACINADOS ANTERIORMENTE			VACINAR PESSOAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS DE RISCO			SIM, 3 PRIMEIRAS DOSES	SIM	SIM						
Poliomielite (vírus inativados)	3 DOSES INICIANDO AOS 2 MESES DE IDADE									REFORÇO		REFORÇO	VACINAR PESSOAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS DE RISCO			SIM, 3 PRIMEIRAS DOSES	SIM	SIM							
Pneumocócicas conjugadas	2 OU 3 DOSES DEPENDENDO DA VACINA UTILIZADA (VPC10 OU VPC13), INICIANDO AOS 2 MESES DE IDADE						REFORÇO	VPC10 OU VPC13 - VACINAR OS NÃO VACINADOS ANTERIORMENTE			VPC13: VACINAR PESSOAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS DE RISCO			VPC 13: UMA DOSE	SIM, VPC10, MENORES DE 5 ANOS	SIM	SIM, VPC10 E VPC13								
Meningocócicas conjugadas (ACWY)	2 DOSES INICIANDO AOS 3 MESES DE IDADE						REFORÇO		REFORÇO		REFORÇO AOS 11 ANOS PARA OS NÃO VACINADOS ANTERIORMENTE: 2 DOSES COM INTERVALO DE 5 ANOS	VACINAR PESSOAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS DE RISCO			SIM, MENC PARA MENORES DE 5 ANOS E MENACWY PARA 11 A 12 ANOS	SIM	SIM, MENC E MENACWY								
Meningocócica B	2 DOSES INICIANDO AOS 3 MESES DE IDADE						REFORÇO	PARA OS NÃO VACINADOS ANTERIORMENTE - DE 12 A 23 MESES E 29 DIAS: 3 DOSES DE 24 MESES A 19 ANOS: 2 DOSES			VACINAR PESSOAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS DE RISCO			NÃO	SIM	NÃO									
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO												SIM	NÃO	NÃO										
Influenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL												SIM, MENORES DE 6 ANOS E MAIORES DE 55 ANOS	SIM	SIM										
Febre amarela	2 DOSES: AOS 9 MESES DE VIDA E AOS 4 ANOS DE IDADE. NAS DEMAIS FAIXAS ETÁRIAS, NÃO HÁ CONSENSO SOBRE A DURAÇÃO DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA VACINA. DE ACORDO COM O RISCO EPIDEMIOLÓGICO, UMA SEGUNDA DOSE. PODE SER CONSIDERADA PELA POSSIBILIDADE DE FALHA VACINAL.												SIM	SIM	NÃO										
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	2 DOSES A PARTIR DOS 12 MESES						VACINAR OS NÃO VACINADOS ANTERIORMENTE			VACINAR PESSOAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS DE RISCO			SIM, ATÉ 49 ANOS	SIM	NÃO										
Varicela (catapora)	2 DOSES A PARTIR DOS 12 MESES						VACINAR OS SUSCETÍVEIS NÃO VACINADOS ANTERIORMENTE						SIM	SIM	SIM										
Hepatite A	2 DOSES A PARTIR DOS 12 MESES						VACINAR OS NÃO VACINADOS ANTERIORMENTE			VACINAR PESSOAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS DE RISCO			SIM, UMA DOSE PARA MENORES DE 5 ANOS	SIM	SIM										
HPV	2 DOSES PARA MENINAS E MENINOS						VACINAR OS NÃO VACINADOS ANTERIORMENTE. PARA MENORES DE 15 ANOS: 2 DOSES. DE 15 ANOS EM DIANTE: 3 DOSES.			VACINAR OS NÃO VACINADOS ANTERIORMENTE, A CRITÉRIO MÉDICO (3 DOSES)			SIM, 2 DOSES. MENINAS (9 A 14 ANOS) E MENINOS (11 A 14 ANOS)	SIM	SIM										
Pneumocócica 23 valente	VACINAR PESSOAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS DE RISCO												2 DOSES COM INTERVALO DE 5 ANOS	NÃO	SIM	SIM									
Herpes zóster	DE 50 A 59 ANOS: A CRITÉRIO MÉDICO												1 DOSE	NÃO	SIM	NÃO									
Dengue	CONTRAINDICADA						RECOMENDADA PARA PESSOAS SOROPOSITIVAS PARA DENGUE, DE 9 A 45 ANOS: 3 DOSES: 0 - 6 - 12 MESES			CONTRAINDICADA			NÃO	SIM	NÃO										



ROTINA



VACINAR NÃO VACINADOS



SITUAÇÕES ESPECIAIS



CONTRAINDICADA